

Pre-trapianto



NUTRISOIL

5 –6 kg/ha
1,5 kg/m³

Solido: incorporare al terreno/substrato.
Liquido: utilizzo in fertirrigazione .
In caso di sterilizzazione del suolo, attendere 15-20 giorni.

Trapianto e affrancamento



RIZA PF

2 kg/ha
200ml/100l

+

RIZACARE

2 kg/ha
300ml/100l

Al trapianto: bagni radicali delle piantine fino a sgocciolamento dei vassoi alveolari. Successivamente: applicazioni radicali. Distribuire con normali attrezzature per la fertirrigazione o impianti a goccia evitando il dilavamento dello strato rizosferico

Sviluppo vegetativo



Fioritura



RIZACARE

2 kg/ha
200ml/100l

Applicazioni radicali. Distribuire con normali attrezzature per la fertirrigazione o impianti a goccia. Evitare il dilavamento dello strato rizosferico.

Maturazione/Raccolta



FILLOCARE

2-3 kg/ha
300ml/100 l

&

Applicazioni fogliari e radicali Utilizzare Rizacare e Fillocare in alternanza, ogni 20-30 giorni , fino al termine del ciclo culturale.

Biostimolazione e
Sviluppo radicale

Salute e Difesa

Protezione dai
nematodi

RIZACARE

2-3 kg/ha

+

NEMACARE

3-5 kg/ha

Al trapianto: bagni radicali delle piantine fino a sgocciolamento dei vassoi alveolari. Successivamente: applicazioni radicali. Distribuire con normali attrezzature per la fertirrigazione o impianti a goccia evitando il dilavamento dello strato rizosferico

NEMACARE

4-5 kg/ha

Applicazioni radicali. Distribuire con normali attrezzature per la fertirrigazione o impianti a goccia., alternando Nemacare con Rizacare e Fillocare ogni 10-15 giorni in base alla pressione infestante.