

Pre-trapianto

Trapianto e affrancamento

Sviluppo vegetativo

Fioritura

Maturazione/Raccolta



Bioestimolazione e
Sviluppo radicale

NUTRISOIL

5 -6 kg/ha
1,5 kg/m3

Solido: incorporare al terreno/substrato.
Liquido: utilizzo in fertirrigazione .
In caso di sterilizzazione del suolo, attendere 15-20 giorni.

RIZA PF

2 kg/ha
200 ml/100 l

+

RIZACARE

2 kg/ha
300ml/100 l

Al trapianto: bagni radicali delle piantine fino a sgocciolamento dei vassoi alveolari. Successivamente: applicazioni radicali. Distribuire con normali attrezzature per la fertirrigazione o impianti a goccia evitando il dilavamento dello strato rizosferico

Salute e Difesa

RIZACARE

2 kg/ha
250ml/100 l

Applicazioni radicali.
Distribuire con normali attrezzature per la fertirrigazione o impianti a goccia. Evitare il dilavamento dello strato rizosferico.

&

FILLOCARE

2-3 kg/ha
300ml/100 l

Applicazioni fogliari e radicali
Utilizzare Rizacare e Fillocare in alternanza, ogni 20-30 giorni , fino al termine del ciclo culturale.

Protezione da
parassiti

NEMACARE

3-4 kg/ha

Applicazioni radicali ogni 15-20 giorni

Difesa da insetti
dannosi

ENDBAG LL

250 ml/100 l

+

ENDBAG MB

250 ml/100 l

Applicazioni fogliari ogni 15 giorni

Conservazione
Post-raccolta

FILLOCARE PLUS

2-3 kg/ha - 200ml/100 l

Applicazioni fogliari
poco prima del raccolto