

Semina



NUTRISOIL

5 –6 kg/ha
1,5 kg/m³

RIZA PF Granulare

15 - 20 kg/ha

Nutrisoil Solido:
incorporare al terreno.
Nutrisoil Liquido: utilizzo
in fertirrigazione .
In caso di sterilizzazione
del suolo, attendere 15-
20 giorni.

Comparsa dei cotiledoni



RIZA PF

2 kg/ha
200ml/100 l

+

RIZACARE

2 kg/ha
200ml/100 l

Applicazioni radicali. Distribuire
con normali attrezzature per la
fertirrigazione o impianti a goccia
evitando il dilavamento dello
strato rizosferico

Foglie distese e dopo ogni taglio




RIZACARE

2 kg/ha
250ml/100l

Salute e Difesa

Applicazioni radicali.
Distribuire con normali
attrezzature per la
fertirrigazione o impianti a
goccia. Evitare il dilavamento
dello strato rizosferico.
Dopo il taglio: applicazioni
fogliari per disinfettare le
ferite da taglio alla dose di 1
litro di Rizacare in 100 litri di
acqua.

Maturazione/Raccolta



FILLOCARE

3 kg/ha
300ml/100 l

&

Applicazioni fogliari /radicali.
Utilizzare Rizacare e Fillocare
in alternanza, ogni 10-15
giorni , fino al termine del ciclo
colturale.

Difesa da insetti
dannosi

ENDBAG LL

250 ml/100 l

+

ENDBAG MB

250 ml/100 l

Applicazioni fogliari ogni 10-15 giorni,
in base al livello di infestazione

Biostimolazione e
Sviluppo radicale