

Fioritura-allegagione – Chiusura grappolo - Invaiaatura

Inizio autunno

Lavorazione terreno



Trapianto barbatelle



Ripresa vegetativa



Pianto



NUTRISOIL

10 g /pianta
5 –6 kg/ha

Solido: nelle
buche dei
rimpiazzi o dei
primi innesti.
Liquido: utilizzo in
fertilizzazione.

RIZA PF

200 ml/100 l

+

RIZACARE

300 ml/100 l

Al trapianto:
bagni radicali
delle barbatelle.

SHELL SP

3 kg/ha
300 ml/100 l

Sugli impianti
esistenti:
applicazioni radicali.
Evitare il
dilavamento dello
strato rizosferico

RIZACARE

500 ml/100 l

Aspersione dei tagli e
dei residui di potatura.

FILLOCARE

3 kg/ha
300ml/100 l

Applicazioni fogliari ogni
30 giorni

RIZACARE

3 kg/ha
300ml/100 l

Applicazioni
radicali. Evitare il
dilavamento dello
strato rizosferico.

Salute e Difesa

Biostimolazione e Sviluppo Radicale

FILLOCARE PLUS

2-3 kg/ha
250ml/100 l

Applicazioni fogliari
poco prima del raccolto, per
la degradazione dei residui
chimici